

Behandling af absces/byld

En absces (byld) er et hulrum fyldt med betændelse (pus). En byld kan opstå i stort set alle organer. I vores klinik tager vi os af bylder, der opstår i huden.

Ubehandlet vil en byld bryde gennem huden eller tømme sig til indre hulrum. Det er derfor en fordel at behandle kirurgisk inden dette sker. I modsætning til en diffus betændelse, kan en byld ikke behandles med antibiotika (penicillin). En klinisk vurdering foretages af lægen inden operation.

Operationen

Operationen udføres i lokalbedøvelse, hvorefter lægen med et snit tømmer bylden for pus. Derefter anbringes en lille meche (vaselineklud) ind i såret, som derefter dækkes med en forbinding. Vaselinekluden sørger for at såret ikke lukker sig for tidligt.

Efter operationen

Med mindre andet er aftalt, fjerner patienten selv forbinding og vaselineklud efter 2 døgn. Det kan være en fordel at gøre dette i badet, da der stadig kan komme betændelse fra såret (dette er normalt og kan vare op til en lille uges tid). Derefter skal såret skylles med håndbruser 3 gange dagligt og såret skal dækkes med en forbinding af hensyn til dit tøj.

I løbet af nogle dage, vil såret lukke fra bunden. Hvis såret er meget dybt, kan det tage længere tid. Hvis bylden er opstået i en hårsæk, kan det være nødvendigt at fjerne hårsækken ved en senere lejlighed. Kontakt klinikken, hvis der fortsat kan føles en knude efter ca. 4-6 uger.

Komplikationer

Det er normalt, at det bløder lidt. Større blødning forekommer meget sjældent.

Meget vigtigt

Skulle der efter operation opstå feber, blødning eller tiltagende smerter bedes du straks kontakte klinikken (33114448) eller 1813

Ved udeblivelse fra en aftalt tid uden afbud senest dagen før, er patienten pligtig til at betale et gebyr på 250 kr. for udeblivelse fra en konsultation og 500 kr. for udeblivelse fra en operation - eller lignende.

Speciallæge Søren Munch Jensen | Ny Kongensgade 21, 1.th | 1557 København V |
www.33114448.com Tlf: 33 11 44 48

