

Behandling af indvendige hæmorider ved elastikmetoden

En indvendig hæmoride er en frembulning ind i den nederste del af endetarmen af en blodåre (vene) og den slimhinde, der ligger oven på blodåren.

Før behandlingen

Behandlingen kræver ingen forberedelser hjemmefra, medmindre du er blevet bedt om at bruge et lille klyx til udrensning af tarmen. Brug af klyx skal ske ca. 1-2 timer før du møder op til behandling.

Behandlingen

Da der ikke er smertesans på indersiden af tarmen, foretages behandlingen uden bedøvelse. Ved elastikmetoden sættes en lille og meget stram elastik hen over hæmoriden. Normalt sættes 1-3 elastikker pr. behandling. Herved stoppes blodforsyningen til hæmoriden, som derefter "visner" og falder af sammen med elastikken.

Efter behandlingen

Mod smerter: Der kan det første halve til hele døgn føles stramning og afføringstrang. Hvis det generer kan man tage smertestillende håndkøbsmedicin (Panodil eller eventuelt Iprén).

Der er ingen restriktioner. Man kan gå normalt på toilettet. Sørg for at holde maven i gang med rigelig væske, fiberholdig kost og motion. Der kan eventuelt suppleres med Sylliflor eller HUSK og svesker. Ved svær forstoppelse kan suppleres med afføringsmiddel f.eks. Magnesia.

I løbet af nogle dage afstødes den afsnørede hæmoride og dette kan medføre noget frisk blødning.

Komplikationer

Der kan udvikles en lille blodansamling, hvilket resulterer i hævelse uden for elastikken. Dette kan udløse en smertereaktion og udtalt ubehag, som skyldes krampe i den indre ringmuskel. Kan lindres med is, smertestillende håndkøbsmedicin eller lokalbedøvende creme(håndkøb). Forsvinder gradvist af sig selv.

Yderst sjældent kan der fra 2-10 dage efter behandlingen opstå kraftig blødning fra tarmen. Ligeledes kan der yderst sjældent optræde kraftige smerter i tarmen ledsaget af feber.

Meget vigtigt

Skulle der efter undersøgelsen opstå blødning, tiltagende smerter eller feber, kontakt da klinikken (33114448) eller 1813.

Ved udeblivelse fra en aftalt tid uden afbud senest dagen før, er patienten pligtig til at betale et gebyr på 250 kr. for udeblivelse fra en konsultation og 500 kr. for udeblivelse fra en operation - eller lignende.

Speciallæge Søren Munch Jensen | Ny Kongensgade 21, 1.th | 1557 København V |
www.33114448.com Tlf: 33 11 44 48

