

Behandling af karsprængninger (mikrosklerosering)

Karsprængninger på benene består af meget tynde blodårer, som ligger overfladisk i huden og derfor synligt for det blotte øje. De kan ligge enkeltvis, men også samlet i områder, som kan blive blå eller lilla misfarvet. De ses ofte i forbindelse med åreknuder, men kan også forekomme alene. Har man åreknuder, bør disse behandles først for at opnå det bedste behandlingsresultat.

Før behandlingen

Behandlingen foregår ambulant og du behøver ikke at tage specielle forholdsregler udover, at du ikke må smøre creme på benene på behandlingsdagen. Behandlingen tager ca. 20 minutter.

Behandling af karsprængninger på ben

En meget lille nål føres ind i den tynde åre og derefter sprøjtes skleroseringsvæsken ind. Formålet er at irritere karvæggen og få karret til at gå til grunde. Afhængig af dets størrelse, absorberes blodkarret af kroppen i løbet af 2 til 6 måneder, men kan tage op til 1 år.

Efter behandlingen skal du have en støtteforbinding på i til dagen efter.

Forventet resultat

Resultatet af behandlingen kan først rigtigt bedømmes efter 6-12 mdr. Karsprængningerne kan forsvinde helt eller blive mindre synlige, og kræver som regel kun 1 behandling det samme sted.

Efter behandling, kan de større kar blive mørke og mere afgrænsede inden de forsvinder.

Man bør være opmærksom på, at der kan dannes et mørkt pigment streg, prik eller skygge, hvor karret har været. Pigmenteringen forsvinder, men det kan tage op til et år.

Mikroinjektionsbehandling et sted på benene udelukker ikke, at der kan opstå nye karsprængninger i de omkringliggende områder eller andre steder på benene.

Efter behandlingen skal du undgå sollys i 14 dage. Du kan evt. anvende solblokker faktor 50.

Komplikationer

Der kan ind imellem dannes en blære på det sted, hvor nålen føres ind i huden. Blæren forsvinder af sig selv og kræver som regel ikke behandling. I sjældne tilfælde kan der forekomme et sår, som oftest ikke kræver behandling.

Hvis behandlingen finder sted ved huden omkring fødderne og anklerne, kan der opstå hævelse og ømhed i de behandlede områder.

En sjælden komplikation i forbindelse med mikrosklerosering af benene er årebetændelse. Hvis årebetændelsen er overfladisk, kan den evt. behandles med en salve. Skulle den opstå i de dybe vener, behandles den med blodfortyndende medicin.

Pris

En behandling på ca. 20 minutter eller når den maksimale dosis af injektionsvæske pr. behandling er anvendt koster kr. 1.500,00. Udgiften dækkes ikke af sygesikringen

Ved udeblivelse fra en aftalt tid uden afbud senest dagen før, er patienten pligtig til at betale et gebyr på 250 kr. for udeblivelse fra en konsultation og 500 kr. for udeblivelse fra en operation - eller lignende.

Speciallæge Søren Munch Jensen | Ny Kongensgade 21, 1.th | 1557 København V |
www.33114448.com Tlf: 33 11 44 48

