

Operation i endetarmsåbningen

Operation i eller omkring endetarmsåbningen foretages oftest med henblik på at fjerne løs hud (marisker), større hæmoroïder, bylder eller vorter.

Før operationen

Det er en god ide, at have smertestillende medicin og afføringsmidler indkøbt, og evt påbegyndt inden operationen.

Man kan 1 time inden operationen tage 2 tabletter panodil a 500 mg og 2 tabletter ipren a 200 mg

Det er en god idé, at have købt hygiejnebind hvis der er blødning eller sekretion efter operationen

Operationen

Operationen udføres i lokalbedøvelse, som anlægges via stik i selve hæmoroïderne eller i omgivelserne til endetarmsåbningen.

Man kan mærke stikket, ligesom lokalbedøvelse hos tandlægen. Det svier og spænder i 10-20 sekunder.

Efter operationen

Lokalbedøvelsen virker i 1-3 timer.

Mod smerter: De første 1-3 dage efter nogle operationer er smertefulde, specielt ved afføring.

Brug Panodil 2x 500 mg og Ipren 2x200 mg , begge 3-4 gange dagligt (fås i håndkøb).

Afføringen må ikke være hård. Toiletbesøg skal kunne foregå uden anstrengelse, hvorfor man med fordel kan anvende lette afføringsmidler (Magnesia tabletter, HUSK, Sylliflor eller Movicol) og ivrigt drikke rigeligt. Afførings-relaterede smerter vil typisk være der i en uges tid.

Forbinding: En eventuel forbinding fjernes dagen efter operationen eller næste gang du skal have afføring.

Ved et renere sår er der færre smerter og hurtigere heling, så renholdelse er helt afgørende.

Operationssårene rengøres bedst ved at skylle med en håndbruser to gange daglig og efter toiletbesøg, indtil operationsområdet er smertefrit. Eventuelt kan kolde omslag anvendes både for at standse blødning og reducere smerter. (du kan med fordel tage vand på et hygiejnebind og lægge det i fryseren).

Der kan i få tilfælde være behov for at sy. Trådene opløses af sig selv og skal ikke fjernes.

Komplikationer

Blødning er meget sjældent, og infektion er yderst sjældent.

Meget vigtigt

Skulle der efter operation opstå feber, blodansamling eller tiltagende smerter bedes du straks kontakte klinikken på telefon 33 11 44 48 eller søge skadestue/vagtlæge.

Ved udeblivelse fra en aftalt tid uden afbud senest dagen før, er patienten pligtig til at betale et gebyr på 250 kr. for udeblivelse fra en konsultation og 500 kr. for udeblivelse fra en operation - eller lignende.

Speciallæge Søren Munch Jensen | Ny Kongensgade 21, 1.th | 1557 København V |
www.33114448.com Tlf: 33 11 44 48

