

Kikkertundersøgelse af den nederste del af tyktarmen(Sigmoideoskopi) efter udrensning med Toilax

Vi udfører undersøgelsen ved hjælp af en bøjelig kikkert, der bliver ført ind gennem endetarmsåbningen og videre op gennem tyktarmen i venstre side, indtil kikkerten når til den tværgående del af tarmen.

Undersøgelsen varer ca. 2 minutter.

Hvis du tager blodfortyndende medicin skal du oplyse dette til lægen.

Det er vigtigt, at du er grundigt udrenset inden undersøgelsen. Du skal udrense tyktarmen hjemme på følgende måde:

Udrensning af tarmen

Ved tidsbestilling er der sendt recept på udrensning til apoteket. Du får udrensning udleveret på apoteket uden omkostning for dig.

Dagen før undersøgelsen

Du må kun indtage flydende kost 24 timer inden undersøgelsen. Du skal drikke 2-3 liter væske (f.eks. vand, juice, bouillon, suppe og smoothie)

Dagen før undersøgelsen skal du tage tabletterne fra Toilax-kombinationspakken på denne måde:

- Kl. 12: tag 2 tabletter fra Toilax-kombinationspakken.
- Kl. 22: tag 2 tabletter fra Toilax-kombinationspakken.

Tabletterne begynder at virke efter 6-12 timer, hvor du kan forvente hyppige afføringer.

På undersøgelsesdagen

Du skal tage din sædvanlige medicin, med undtagelse af blodfortyndende medicin.

Ca. 1½ time inden du tager hjemmefra skal tarmen tømmes ved hjælp af det klyksma, som ligger i pakken. Det er bedst, hvis du ligger ned, når du indfører tubespisen (uden hætte) i endetarmen. Du skal tømme tuben og vente indtil du får afføringstrang, gerne 5 minutter eller længere.

Undersøgelsen:

Når du ankommer til klinikken, bedes du benytte toilettet inden undersøgelsen, uanset om du føler afføringstrang eller ej. For at kunne efterse tarmens slimhinde er det nødvendigt at puste luft ind i tarmen. Det kan give lidt mavekneb og fornemmelse af oppustethed. Dette forsvinder hurtigt.

Efter undersøgelsen

Der er som regel ikke noget i vejen for, at man kan gå på arbejde umiddelbart efter undersøgelsen.

Svar på undersøgelsen

Du informeres om undersøgelsesresultatet af lægen umiddelbart efter undersøgelsen. Hvis der er taget vævsprøver vil du efter ca. 1 uge få besked på prøvesvaret, enten ved samtale i klinikken eller ved et telefonopkald.

Komplikationer

Hvis der er taget vævsprøver, kan dette medføre minimale mængder blod i afføringen i det følgende døgn. I meget sjældne tilfælde kan undersøgelsen kompliceres med hul på tarmen. Skulle der opstå tiltagende smerter, feber eller blødning fra tarmen bedes du straks kontakte klinikken eller søge skadestue/vagtlæge.

Ved udeblivelse fra en aftalt tid uden afbud senest dagen før, er patienten pligtig til at betale et gebyr på 250 kr. for udeblivelse fra en konsultation og 500 kr. for udeblivelse fra en operation - eller lignende.

Speciallæge Søren Munch Jensen | Ny Kongensgade 21, 1.th | 1557 København V | www.33114448.com
Tlf: 33 11 44 48

