

## Vejledning i pasning af operationssår

I forbindelse med din operation, vil vi give dig nogle råd om pasning af operationssåret.

- Lokalbedøvelsen holder sig 1-4 timer. Herefter kan der komme lette til moderate smerter i såret. Det vil oftest være tilstrækkeligt at tage f.eks. 1 gram Panodil dog højst 4 gange dagligt.
- Der kan forekomme blå-gule misfarvninger af huden omkring såret. Dette forsvinder efter ca. 1 uge.
- Skulle forbindingen blive våd, skal den fjernes, idet en våd forbindelse giver grobund for bakterier. Skulle det blive nødvendigt at fjerne forbindingen, erstattes denne med et almindeligt plaster.
- Forbindingen fjernes efter 2 døgn, og du må derefter gerne tage brusebad. Karbad og svømmehal bør undgås. Såret behøver derefter ikke at være tildækket, medmindre der er risiko for, at det udsættes for støv eller snavs.
- Undgå at udsætte såret for sol eller solarium de første 3 måneder.
- Når du opholder dig ude i solen, anbefaler vi at du beskytter såret med et plaster eller solcreme med minimum faktor 20.
- Suturer skal normalt fjernes hos os 5-10 dage efter operationen. Hvis der er sendt væv til undersøgelse, vil du samtidig få resultatet af undersøgelsen.

### Meget vigtigt

Skulle der efter operationen opstå tiltagende smerter, blødning eller feber, bedes du straks kontakte klinikken på telefon 33 11 44 48 eller efter åbningstid på mobil tlf.: 26 79 66 66, alternativt søge skadestue/-vagt læge.

Speciallæge Søren Munch Jensen | Ny Kongensgade 21, 1.th | 1557 København V |  
[www.33114448.com](http://www.33114448.com) Tlf: 33 11 44 48

